

# Cvičení LAA2

## Inverzní matice a operátor

1. Necht  $V$  je vektorový prostor nad tělesem  $T$  a  $A \in \mathcal{L}(V)$ . Dokažte implikaci: Je-li  $A^2 - A + I = \Theta$ , pak  $A$  je regulární.
2. Jsou dány matice

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \mathbb{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \mathbb{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Spočtete  $\mathbb{A}^{-1}\mathbb{B}$ ,  $\mathbb{C}\mathbb{A}^{-1}$  bez toho, abyste spočetli  $\mathbb{A}^{-1}$ . Poté  $\mathbb{A}^{-1}$  vypočítejte a předchozí výsledek pak pomocí nalezené  $\mathbb{A}^{-1}$  zkontrolujte.

3. Pro jaká  $\alpha \in \mathbb{C}$  existuje  $\mathbb{A}^{-1}$ ? Pro taková  $\alpha$  ji najděte.  $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$ .

4. Najděte  $\mathbb{A}^{-1}$ , je-li  $\mathbb{A} \in \mathbb{C}^{n,n}$  a  $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

5. Necht  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$  a  ${}^{\mathcal{X}}A^{\mathcal{Y}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ , kde  $\mathcal{X} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$  a  $\mathcal{Y} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$  jsou báze  $\mathbb{C}^2$ . Je  $A$  regulární? Pokud ano, najděte  ${}^{\mathcal{X}}(A^{-1})^{\mathcal{Y}}$ .

6. Necht  $V_3$  je vektorový prostor nad tělesem  $T$  a  $A \in \mathcal{L}(V_3)$ . Necht  $\mathcal{X} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3)$  je báze  $V_3$ . Necht pro každé  $\vec{x} \in V_3$  platí  $A\vec{x} = (\alpha_1 + 2\alpha_2)\vec{x}_1 + (\alpha_2 + 2\alpha_3)\vec{x}_2 + (\alpha_3 + 2\alpha_1)\vec{x}_3$ , kde  $(\vec{x})_{\mathcal{X}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$ . Je  $A$  regulární? Pokud ano, najděte  ${}^{\mathcal{X}}(A^{-1})$ .

7. Necht  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3)$  a platí  $Ax(t) = x(t+1) - 2x(t)$  pro každé  $x \in \mathcal{P}_3$  a  $t \in \mathbb{C}$ . Je  $A$  regulární? Pokud ano, najděte  ${}^{\mathcal{X}}(A^{-1})^{\mathcal{Y}}$ , kde  $\mathcal{X} = (x_1, x_2, x_3)$  a  $\mathcal{Y} = (y_1, y_2, y_3)$  jsou báze  $\mathcal{P}_3$  splňující pro každé  $t \in \mathbb{C}$

$$x_1(t) = 3 - t + 2t^2, \quad x_2(t) = 2 + 3t - t^2, \quad x_3(t) = -1 + 2t + 4t^2,$$
$$y_1(t) = -8 - 3t - 2t^2, \quad y_2(t) = -2 - t + t^2, \quad y_3(t) = -13 - 10t - 4t^2.$$

## Domácí úlohy

1. Naprogramujte úplnou Gaussovou eliminaci pro hledání inverzní matice.
2. Necht  $\mathbb{A} \in T^{n,n}$  regulární. Jak se změní matice  $\mathbb{A}^{-1}$ , jestliže v matici  $\mathbb{A}$ :

- a) zaměníme  $i$ -tý a  $j$ -tý řádek,
- b)  $i$ -tý řádek vynásobíme číslem  $\alpha \in T, \alpha \neq 0$ ,
- c) k  $i$ -tému řádku přičteme libovolný násobek  $j$ -tého řádku ( $i \neq j$ )?

Jak se změní inverzní matice při podobných transformacích sloupců?

3. Necht  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{2,2})$ ,  $A\mathbb{X} = -\mathbb{X}^T$  pro každé  $\mathbb{X} \in \mathbb{R}^{2,2}$ . Dokažte, že  $A$  je regulární operátor na prostoru  $\mathbb{R}^{2,2}$ , a nalezněte  $\mathcal{Y}(A^{-1})^{\mathcal{E}}$ , je-li  $\mathcal{Y} = \left( \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \right)$  báze prostoru  $\mathbb{R}^{2,2}$  a  $\mathcal{E}$  je standardní báze  $\mathbb{R}^{2,2}$ .

4. Nalezněte množinu všech řešení následujících maticových rovnic:

a)  $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \mathbb{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$

b)  $\mathbb{X} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix},$

c)  $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \mathbb{X} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$