

## Cvičení LAA13

### Rieszova věta a sdružený operátor, normální operátory a matice

1. Nechť  $\varphi \in (\mathbb{C}^3)^\#$ , kde  $\mathbb{C}^3$  je unitární prostor. Najděte  $\vec{z} \in \mathbb{C}^3$  tak, že pro každé  $\vec{x} \in \mathbb{C}^3$  platí  $\varphi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \vec{z} \rangle$ .

$$\varphi(\vec{x}) = 2x_1 + ix_2 - 4x_3 \quad \text{pro každé } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

2. Nechť  $\varphi \in (\mathbb{R}^3)^\#$  se skalárním součinem

$$\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 2x_3 y_3 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - x_2 y_3 - x_3 y_2$$

pro každé  $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ . Dále  $(\varphi)_{\mathcal{X}^\#} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ , kde  $\mathcal{X} = (\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix})$ .  
Najděte  $\vec{z} \in \mathbb{R}^3$  tak, že pro každé  $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$  platí  $\varphi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \vec{z} \rangle$ .

3. Nechť  $\mathcal{X}$  je ON báze  $\mathcal{H}_2$  nad  $\mathbb{C}$ . Najděte všechna  $\alpha \in \mathbb{C}$  tak, aby  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_2)$  byl unitární.

$$(a) {}^{\mathcal{X}} A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(b) {}^{\mathcal{X}} A = \begin{pmatrix} \alpha & \frac{1}{2} \\ \frac{-1}{2} & \alpha \end{pmatrix}.$$

4. V eukleidovském prostoru  $\mathbb{R}^3$  jsou dány podprostory

$$P \equiv \begin{matrix} x+y \\ z \end{matrix} = \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}, \quad Q \equiv x-y = 0.$$

Nechť  $\mathcal{X} = (\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix})$  je báze  $\mathbb{R}^3$ ,  $A_P$  je projektor na  $P$  podle  $Q$ . Sestavte  ${}^{\mathcal{X}}(A_P^*)$ .

5. Nechť  $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ , kde  $\mathbb{R}^3$  je eukleidovský prostor. Dále pro každé  $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$  je definováno  $A\vec{x} = \vec{x} \times \vec{a}$ .

(a) Je  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ ?

(b) Je  $A$  diagonalizovatelný?

(c) Je  $A$  normální?

(d) Je  $A$  regulární?

6. Nechť  $D$  je operátor derivování na  $\mathcal{P}_3$  se skalárním součinem

$$\langle x | y \rangle = \alpha_0 \overline{\beta_0} + \alpha_1 \overline{\beta_1} + \alpha_2 \overline{\beta_2},$$

kde  $x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2$  a  $y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2$  pro každé  $t \in \mathbb{C}$ . Nechť  $\mathcal{X} = (x_1, x_2, x_3)$  je báze  $\mathcal{P}_3$ , kde  $x_1(t) = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t$ ,  $x_2(t) = t^2 - 1$ ,  $x_3(t) = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t$  pro každé  $t \in \mathbb{C}$ . Najděte  ${}^{\mathcal{X}}(D^*)$ .

7. Nechť  $\mathcal{X}$  je ON báze  $\mathcal{H}_3$  nad  $\mathbb{C}$ ,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_3)$ ,  ${}^{\mathcal{X}} A = \begin{pmatrix} 3 & -i & 0 \\ i & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ . Najděte ON bázi  $\mathcal{Y}$ , v níž má  $A$  diagonální tvar.

## Domácí úkoly

1. Nechť  $\mathcal{X} = (\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix})$  je báze unitárního prostoru  $\mathbb{C}^2$ ,  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$  a  ${}^{\mathcal{X}}A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ . Najděte  ${}^{\mathcal{X}}(A^*)$  jak pomocí věty o matici sdruženého operátoru, tak i nějakým jiným způsobem.
2. (přednáška) Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ , kde  $\mathbb{R}^3$  je eukleidovský.

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$A$  je ortogonální a  $\det A < 0$ . Najděte  ${}^{\mathcal{E}}A$ .

3. (přednáška) Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ , kde  $\mathbb{R}^3$  je eukleidovský.

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$A$  je symetrický a má 2-násobné záporné vlastní číslo. Najděte  ${}^{\mathcal{E}}A$ .