

## Cvičení LAA6

### Vlastní čísla a vlastní vektory operátorů

1. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$  je operátor zrcadlení podle osy  $x$ . Najděte vlastní čísla a vlastní vektory operátoru  $A$ . Je diagonalizovatelný?
2. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$  je operátor rotace o  $\frac{\pi}{2}$  proti směru ručiček hodin. Najděte vlastní čísla a vlastní vektory operátoru  $A$ . Je diagonalizovatelný?
3. Nechť  $A \in \mathcal{L}(V_3)$ ,  $\mathcal{X}$  je báze  $V_3$ . Je  $A$  diagonalizovatelný operátor? Pokud ano, najděte bázi  $\mathcal{Y}$  tak, že  ${}^{\mathcal{Y}}A$  je diagonální matice.

(a)

$${}^{\mathcal{X}}A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & -4 \\ 6 & 4 & -4 \end{pmatrix},$$

(b)

$${}^{\mathcal{X}}A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Nechť  $A \in \mathcal{L}(V_3)$ ,  $\mathcal{X}$  je báze  $V_3$ . Je  $A^{-1}$  diagonalizovatelný operátor? Pokud ano, najděte bázi  $\mathcal{Y}$  tak, že  ${}^{\mathcal{Y}}(A^{-1})$  je diagonální matice.

$${}^{\mathcal{X}}A = \begin{pmatrix} -20 & 9 & -18 \\ 6 & -5 & 6 \\ 24 & -12 & 22 \end{pmatrix}.$$

5. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ ,  $\mathcal{X} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$  je báze  $\mathbb{R}^4$  a  $\mathcal{E}$  je standardní

báze  $\mathbb{R}^4$ . Je  $A$  diagonalizovatelný operátor? Pokud ano, najděte bázi  $\mathcal{Y}$  tak, že  ${}^{\mathcal{Y}}A$  je diagonální matice.

$${}^{\mathcal{X}}A^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$  a  $\mathcal{E}$  je standardní báze  $\mathbb{R}^4$ . Najděte všechna  $\alpha \in \mathbb{R}$ , pro která je  $A$  diagonalizovatelný.

$${}^{\mathcal{E}}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3)$  splňuje  $Ax(t) = x(\alpha - 2t)$  pro každé  $x \in \mathcal{P}_3$  a každé  $t \in \mathbb{C}$ . Pro jaká  $\alpha \in \mathbb{C}$  je  $A$  diagonalizovatelný? Pro taková  $\alpha$  najděte  $\mathcal{Y}$  bázi  $\mathcal{P}_3$  takovou, že  ${}^{\mathcal{Y}}A$  je diagonální matice.
8. Nechť  $D, S \in \mathcal{L}(\mathcal{P})$  jsou operátory derivování a integrování na  $\mathcal{P}$ . Najděte spektrum a všechny vlastní vektory  $D$  a  $S$ .
9. Nechť  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{P})$  splňuje  $Ax(t) = x(t+1)$  pro každé  $x \in \mathcal{P}$  a každé  $t \in \mathbb{C}$ . Najděte spektrum a všechny vlastní vektory  $A$ .

## Domácí úloha

1. Necht  $P, Q \subset\subset V, P \neq V, Q \neq V, P \oplus Q = V$ . Necht  $A_P$  je projektor na  $P$  podle  $Q$ .

- Nalezněte  $\sigma(A_P)$ .
- Je-li  $\dim V \in \mathbb{N}$ , určete algebraickou a geometrickou násobnost vlastních čísel operátoru  $A_P$ .
- Je operátor  $A_P$  diagonalizovatelný v případě  $\dim V \in \mathbb{N}$ ?

2. Necht  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$

$$\varepsilon_A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

V následujících úlohách využijte teoretické znalosti tak, abyste počítali co nejméně.

- Najděte spektrum  $A$  a určete, pro jaká  $\alpha \in \mathbb{R}$  je  $A$  diagonalizovatelný.
  - Najděte spektrum  $A^{-1}$  a určete, pro jaká  $\alpha \in \mathbb{R}$  je  $A^{-1}$  diagonalizovatelný.
3. Naprogramujte Cramerovo pravidlo a výpočet inverzní matice pomocí adjungované (1 týden).