

Podprostor

Z teorie je nutné znát pojmy: podprostor, součet podprostorů $P + Q$, průnik podprostorů $P \cap Q$. A je důležité vědět, že $P + Q$ a $P \cap Q$ jsou vektorové prostory, a tudíž má smysl hledat jejich bázi a dimenzi. Také využijeme 1. větu o dimenzi.

1. [cvičení] Zjistěte, zda množina $M \subset \mathbb{C}^3$ je podprostor \mathbb{C}^3 , a pokud je, určete bázi a dimenzi M . (Využijte faktu, že dimenze vlastního podprostoru je menší než dimenze prostoru samého.)

$$(a) M = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid \alpha_j \in Z \quad \forall j \in \{1, 2, 3\} \right\},$$

$$(b) M = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \right\},$$

$$(c) M = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \wedge \alpha_1 - \alpha_3 = 0 \right\},$$

$$(d) M = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 1 \right\}.$$

2. [cvičení] Nechť $P \subset \mathbb{R}^3$, $Q \subset \mathbb{R}^3$. Nalezněte dimenzi a bázi $P + Q$ a $P \cap Q$, je-li

$$P = \left[\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right]_{\lambda} \text{ a } Q = \left[\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right) \right]_{\lambda}.$$

3. [cvičení] Nechť $P \subset \mathbb{R}^4$, $Q \subset \mathbb{R}^4$. Nalezněte dimenzi a bázi $P + Q$ a $P \cap Q$, je-li

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \wedge 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 - \alpha_4 = 0 \right\},$$

$$Q = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid -2\alpha_1 + \alpha_2 + 5\alpha_3 + 5\alpha_4 = 0 \wedge 4\alpha_1 + 3\alpha_2 + 5\alpha_3 - 5\alpha_4 = 0 \right\}.$$

4. [cvičení] Nechť $P \subset \mathbb{C}^3$, $Q \subset \mathbb{C}^3$. Nalezněte dimenzi a bázi $P + Q$ a $P \cap Q$, je-li

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0 \right\} \text{ a}$$

$$(a) Q = \left[\left(\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right]_{\lambda},$$

$$(b) Q = \left[\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_{\lambda}.$$

- (c) Nechť $P \subset \mathbb{R}^3$, $Q \subset \mathbb{R}^3$, $V \subset \mathbb{R}^3$. Nalezněte dimenzi a bázi $P \cap Q \cap V$, je-li $P = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_\lambda$, $Q = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_\lambda$ a $V = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_\lambda$.

Téma písemčky na příště

Podprostor. Neprozradím tentokrát, zda půjde o teoretickou otázku nebo lehký příklad.

Zapamatujte si

Nechť V je vektorový prostor nad tělesem T a nechť $M \subset V$.

1. $M \subset V$ právě tehdy, když M je vektorovým prostorem nad T (operace definovány stejně jako ve V).
2. Jsou-li $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ vektory z V , pak $[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n]_\lambda$ je nejmenší podprostor V , který vektory $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ obsahuje.
3. Pokud $P \subset V$ a $Q \subset V$, potom nejmenší podprostor V obsahující P i Q (tedy i jejich sjednocení) je $P + Q$. POZOR! $P \cup Q$ obecně podprostor V netvoří.

Příklad: Nechť $V = \mathbb{R}^2$, $P = [(\frac{1}{0})]_\lambda$ a $Q = [(\frac{0}{1})]_\lambda$, pak $(\frac{1}{0}) + (\frac{0}{1}) = (\frac{1}{1}) \notin P \cup Q$, a tedy $P \cup Q$ není podprostorem V .

Pro zajímavost

1. **[cvičení]** Uvažujte vektorový prostor šipek (začínajících ve stejném bodě) v rovině. Rozmyslete si, jaké vlastní podprostory tento prostor obsahuje. Stejnou úvahu proveďte i pro vektorový prostor šipek v prostoru.
2. Ukažte, že matice s prvky z T rozměru $m \times n$, které mají na předepsaných místech nuly, tvoří podprostor $T^{m,n}$.
3. Rozmyslete si, že vektorový prostor T nad T má jen dva podprostory: $\{0\}$ a sám sebe T .
4. Nechť V je podmnožina $\mathbb{R}^{2,2}$ tvořená
 - (a) tzv. symetrickými maticemi, tj.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{11}, a_{22} \in \mathbb{R}, a_{12} = a_{21} \right\},$$

- (b) tzv. diagonálními maticemi, tj.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{11}, a_{22} \in \mathbb{R} \right\}.$$

Zjistěte, zda $V \subset \mathbb{R}^{2,2}$.

Výsledky: Podprostor

- M není uzavřená vůči násobení číslem z C ,
 - M je podprostor dimenze 2,
 - M je podprostor dimenze 1,
 - M není uzavřená vůči operacím.
- $\dim P + Q = 3, \dim P \cap Q = 1$, báze $P + Q$ je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$, báze $P \cap Q$ je např. $\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.
- $\dim P + Q = 3, \dim P \cap Q = 1$, báze $P + Q$ je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, báze $P \cap Q$ je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.
- $\dim P + Q = 3, \dim P \cap Q = 1$, báze $P + Q$ je např. \mathcal{E}_3 , báze $P \cap Q$ je např. $\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.
 - $\dim P + Q = \dim P \cap Q = \dim P = \dim Q = 2$, tj. $P + Q = P \cap Q = P = Q$, báze je u všech těchto prostorů např. $\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.
 - Paltí $P \cap Q \cap V = P$, proto $\dim P \cap Q \cap V = 2$ a báze je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$.

Pro zajímavost

- Jsou to pouze přímky jdoucí počátkem a nulový vektor (počátek).
V prostoru jsou to navíc roviny jdoucí počátkem.
- Snadno uvážíme, že při sčítání a násobení číslem se nuly zachovávají.
-
- Obě vlastnosti se při sčítání a násobení číslem zachovávají.